

Aktif Madde: Biyoaktif sığır kolostrum

Üretim Yeri: Polonya

Kategori: Yaralarda, sıyrıklarda, yanıklarda vb. doku yenilenmesi.

Tip: Krem

Endikasyonları: Estetik operasyon izleri, yatak yaraları, yanıklar, iyileşmesi zor veya iyileşmeyen kronik yaralar, skar oluşumu, yara izleri, akne, Diyabetik ayak sendromu, Ülserler (trofik cilt ülserleri, venöz ve arteriyel ülserler dahil)

Kontrendikasyonlar: Mukozada kullanmayın. Gözlerle temasından kaçının. Ürünün içeriğindeki herhangi bir maddeye alerjiniz varsa kullanmayınız.

Uygulama:

1. Dikiş İzleri ve Lazer, Koter, Altın İğne vb. Çeşitli Estetik Operasyonlar Sonrası Hızlı İyileşme için

Varsa, bir doktor tarafından önerilen protokolü takip edecektir.

Özel Önlemler

Operasyon sonrası 3. günden itibaren günde 1 defa olarak ince bir tabaka halinde uygulanmalı ve hekimin önerisi durumunda steril pansuman yapılmalıdır. Skar doku oluşumundan önce kullanılması ürün etkinliğini artırır. Ürün açık yaraya uygulanabilir.

2. Diyabetik Olmayan Hastalarda Açık Yaralar / Yanıklar Ülserler için

Genel Önlemler

Varsa, yaralara yol açan mevcut hastalıkları tedavi etmek için bir doktor tarafından önerilen protokolü takip edecektir (örn. antibiyotikler, anti-inflamatuar vb.).

Özel Önlemler

Yara, salin (fizyolojik serum) veya hidrojen peroksit ile günlük olarak temizlenecektir; kuruduktan sonra krem yaranın tüm yüzeyine ince bir tabaka halinde uygulanacak ve yaranın gerektirmesi durumunda steril pansuman yapılacaktır. Eksüda /süpürasyon yarasının miktarına bağlı olarak günde 1 veya 2 kez veya gerekirse daha fazla lokal tedavi uygulanacaktır.

3. Şeker Hastalarında Açık Yaralar

Genel Önlemler

Varsa, yaralara yol açan mevcut hastalıkları tedavi etmek için bir doktor tarafından önerilen protokol takip edilecektir (Örn. antibiyotikler, anti-inflamatuar, vb.). Kılavuzlara göre metabolik dengeyi, diyabet tedavisini, diyabetik nöropatiyi ve diyabetik arteriyopatiyi düzeltmeye yardımcı niteliktedir.

Özel Önlemler

Yaranın tipine bağlı olarak (nöropatik veya arteriyopatik neden veya karışık) kılavuzlar altında terapötik önlemler uygulanacaktır: basınç azaltıcı ekim, nekrotik doku ve çevresindeki kallusun cerrahi debridmanı, vb. ve yerel tedavi: salinle günlük temizlik (fizyolojik serum). Kuruduktan sonra krem, yaranın tüm yüzeyine ince bir tabaka halinde uygulanmalı ve steril pansuman uygulanmalıdır. Eksüda / süpürasyon yarasının miktarına bağlı olarak günde 1 veya 2 kez veya gerekirse daha fazla lokal tedavi uygulanacaktır. Eksüdası olmayan kuru yaralarda günde bir kez, eksüdası orta veya yüksek olan eksüdalı yaralarda günde 2-3 kez uygulanması yeterlidir.

Ana Bileşenler: Sığır kolostrumu, koloidal gümüş, alantoin, pentanol, e-vitami

Yan Etkiler: Ürünün bilinen bir yan etkisi veya kontrendikasyonu yoktur.

Sunum: 15 ml tüp

Sıcaklığı Koruyun: 10-25 °C